МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1501 от « 22 » мая 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Инвиво», ОГРН 1082323000495

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Баксис, Ж (титр не менее 10^9 КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 63-Z)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 242-01-1501-1

на срок по « 21 » мая 2027 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев

(подпись)

М. П.

№ 001701

© ЗАО «Первый печатный двор». г. Москва. 2015 г. Уровень «Б»

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2 - 5 л/га	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая - через 2 недели после появления всходов и далее при необходимости через 14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)
1 -2 л/т	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
20 мл/кг	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов. Расход рабочей жидкости - 1 - 1,5 л/кг	
3-5 л/га	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(2)
20 мл/кг	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев	Предпосевное замачивание семян в 2 % рабочем растворе в течение 1 -2 часов. Расход рабочей жидкости - 1,0 - 1,5 л/кг	-(1)
3 -5 л/га			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 - 30 дней. Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	-(2)
20 мл/кг	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость, альтернариоз	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1 -2 часов. Расход рабочей жидкости - 1,0- ,5 л/кг	-(1)

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Баксис, Ж (титр не менее 10^9 КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 63-Z) от 22 мая 2017 г. № 1501

1	2	3	4	5
3-5 л/га	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)
			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 - 30 дней. Расход рабочей жидкости 400 л/га	-(2)
20 мл/кг	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, корневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1 -2 часов Расход рабочей жидкости 1,0 - 1,5 л/кг	-(1)
3 - 8 л/га			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 - 30 дней. Расход рабочей жидкости 800 - 1000 л/га	-(2)
4-7 л/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие опрыскивания - после цветения с интервалом 10-15 дней). Расход рабочей жидкости 1000 - 1500 л/га	-(4)
4-8 л/га	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль, церкоспороз	Опрыскивание лозы в фазу начала движения сока и набухания почек. Повторная обработка - в фазу 2-4 листьев, перед и после цветения. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	-(2)
3-8 л/га	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 18-20 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	- (2-4)
3 л/га	Лук	Шейковая гниль, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: 1-е - по всходам, последующие с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости - 200- 250 л/га	-(4)
2-5 л/га			Обработка почвы перед посевом и/или через 15 дней после посева, повторная обработка - через 1-1,5 месяца. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Баксис, Ж (титр не менее 10^9 КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 63-Z)
от 22 мая 2017 г. № 1502

1	2	3	4	5
1 л/т	Пшеница яровая, ячмень яровой	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистость листьев	Предпосевная обработка семян за 3- 12 дней до посева или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
1-1,5 л/га		Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)
1 л/т	Пшеница озимая, ячмень озимый	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистости	Предпосевная обработка семян за 3- 12 дней до посева или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
1-1,5 л/га		Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)
2-3 л/га	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации для профилактики и/или при первых признаках заболевания. Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1-2)
1 л/т	Подсолнечник	Серая гниль, семенная инфекция; белая гниль, прикорневая форма, альтернариоз плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Баксис, Ж (титр не менее 10^9 КОЕ/мл Bacillus subtilis, штамм 63-Z)
от 22 мая 2017 г. № 1502

1	2	3	4	5
1 л/т	Соя	Аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
1 л/т	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозные корневые и стеблевые гнили, фузариоз и плесневение семян початков	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)
2 л/га	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ (при опрыскивании) – 1 день.

Запрещается применение препарата:
авиационным методом;
в личных подсобных хозяйствах;
в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев